



ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Дозы для людей с иммунодефицитом

Основной серией была Pfizer или Moderna

Дополнительная (3^я) доза мРНК-вакцины настоятельно рекомендована для людей 12 лет и старше с умеренно или значительно ослабленной иммунной системой (например, при наличии рака крови, при прохождении определенной противораковой терапии, после пересадки органов или при наличии определенных аутоиммунных заболеваний).

Эта доза должна быть той же вакцины от COVID-19, что и основная серия. Проконсультируйтесь со своим врачом о необходимости получения дополнительной дозы от COVID-19 и о наиболее подходящем времени для ее получения, исходя из вашего текущего плана лечения. Это особенно важно, если вы собираетесь начать или возобновить иммуносупрессивную терапию.

Стимулирующая доза настоятельно рекомендована как минимум через 6 месяцев после прививки дополнительной (3^й) дозой и в качестве нее может быть применена любая вакцина от COVID-19.

Pfizer – дополнительная доза должна быть Pfizer



Moderna – дополнительная доза должна быть Moderna



Основной серией была Johnson & Johnson (J&J)

Получение стимулирующей дозы настоятельно рекомендуется для людей с умеренным или тяжелым иммунодефицитом, у которых основной вакциной был J&J. Проконсультируйтесь со своим врачом о наиболее подходящем времени для ее получения, исходя из вашего текущего плана лечения. Это особенно важно, если вы собираетесь начать или возобновить иммуносупрессивную терапию.



Если вашей основной серией была вакцина, внесенная в список ВОЗ, или вакцина из клинического испытания. Если вам 12 лет и более, и вы считаетесь полностью вакцинированным в США и у вас умеренно или значительно ослабленная иммунная система, вам настоятельно рекомендуется привиться дополнительной дозой **вакцины от COVID-19 компании Pfizer**. Она должна быть получена как минимум через 28 дней после прививки основной серией вакцины.

Проконсультируйтесь со своим врачом о необходимости привиться дополнительной дозой вакцины от COVID-19 и о лучшем времени для ее получения на основании вашего текущего плана лечения. Это особенно важно, если вы собираетесь начать или возобновить иммуносупрессивную терапию. *Стимулирующая доза рекомендована как минимум через 6 месяцев после прививки дополнительной (3^й) дозой.* Вакцина от COVID-19 компании Pfizer – это единственная вакцина, утвержденная в качестве дополнительной или стимулирующей дозы для людей, которые не привились серией вакцины от COVID-19, утвержденной/одобренной FDA.

